

归芍合剂

Guishao Heji

【处方】 山麦冬 167g 枳实 150g 厚朴 150g
木香 167g 白术 167g 当归 167g
白芍 167g 大黄 167g 肉苁蓉 167g
砂仁 100g 火麻仁 250g 郁李仁 100g
莱菔子 250g 陈皮 150g 法半夏 150g
甘草 100g

【制法】 以上十六味，加水煎煮三次，第一次 1.5 小时，第二次和第三次各 1 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至约 1500ml，加 2 倍量乙醇，静置，取上清液，回收乙醇，浓缩至近 1000ml，滤过，滤液加蛋白糖、山梨酸钾各 1.5~2g，混匀，加水至 1000ml，分装，即得。

【性状】 本品为棕褐色液体；气微香、味甜、微苦、涩。

【鉴别】 (1) 取本品 2ml，加 10% 硫酸溶液 5ml，水浴加热 2~10 分钟，放冷，加 2ml 乙醚振摇，静置后分取醚层，加入 5% 氢氧化钠溶液 1ml，下层显紫红色。

(2) 取本品 40ml，加盐酸 2ml，加热煮沸 5 分钟，放冷，用三氯甲烷 30ml 振摇提取，分取三氯甲烷液，蒸干，残渣加三氯甲烷 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取麦冬对照药材 1g，加水 20ml，煎煮 10 分钟，滤过，滤液加盐酸 0.5ml，同法制成对照药材溶液，照薄层色谱法（中国药典 2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷—丙酮（4：1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10% 硫酸乙醇溶液，在 105℃ 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 相对密度 应不低于 1.02（中国药典 2025 年版四部通则 0601）。

pH 值 应为 4.5~6.5（中国药典 2025 年版四部通则 0631）。

其他 应符合合剂项下有关的各项规定（中国药典 2025 年版四部通则 0181）。

【功能与主治】 理气健脾、润肠通便，用于术后、久病体弱、肠燥便秘者。

【用法与用量】 口服。一次 10ml，一日 2 次或遵医嘱。

【规格】 每支装 10ml

【贮藏】 密封。置阴凉干燥处。