

开胃消食合剂

Kaiwei Xiaoshi Heji

【处方】 姜厚朴 30g	茯苓 60g	焦山楂 50g
炒六神曲 50g	焦谷芽 60g	焦麦芽 60g
木香 30g	荷叶 60g	白术 50g
陈皮 50g	冬瓜子 60g	龙胆 10g
槟榔 50g		

【制法】 以上十三味，加水充分浸泡后煎煮二次，第一次 2 小时，第二次 1.5 小时，煎煮液滤过，合并，静置 12 小时，取上清液浓缩至适量，加蛋白糖 10g、苯甲酸钠 3g，煮沸使溶解，加水调整全量至 1000ml，搅匀，滤过，分装，即得。

【性状】 本品为棕色的液体；味苦。

【鉴别】 （1）取本品 50ml，加乙酸乙酯 50ml，振摇提取，分取乙酸乙酯层，加水洗涤 2 次，每次 30ml，弃去水层，分取乙酸乙酯层，蒸干，残渣加乙醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取橙皮苷对照品，加甲醇制成饱和溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 1~2 μ l，分别点于同一聚酰胺薄膜上，以醋酸为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 1%三氯化铝乙醇溶液，置紫外光灯 (365nm)下检视，供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同的荧光斑点。

（2）取本品 120ml，加浓氨试液调节 pH 值至 10 以上，用三氯甲烷振摇提取 3 次，每次 40ml，合并三氯甲烷液，加稀盐酸 5ml 及水 20ml，振摇，分取酸水层，用浓氨试液调节 pH 值至 10 以上，再用三氯甲烷振摇提取 3 次，每次 10ml，合并三氯甲烷溶液，低温蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取槟榔对照药材 4g，加浓氨试液 4ml 使湿润，再加三氯甲烷 40ml，超声处理 20 分钟，滤过，残渣用三氯甲烷 10ml 洗涤，合并三氯甲烷溶液，自加“稀盐酸 5ml 及水 20ml”起，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述二种溶液各 15 μ l，分别点于同一以羧甲基纤维素钠为粘合剂的硅胶 G 薄层板上，以环己烷-乙酸乙酯-浓氨试液(7.5:7.5:0.2)为展开剂，置氨蒸气预饱和的展开缸内，展开，取出，晾干，喷以稀碘化铋钾试液。供试品色谱中在与对照药材色谱相应的位置上，显相同的橘红色斑点。

【检查】 相对密度 应不低于 1.03（中国药典 2025 年版四部通则 0601）。

pH 值 应为 3.5~5.5（中国药典 2025 年版四部通则 0631）。

其他 应符合合剂项下有关的各项规定（中国药典 2025 年版四部通则 0181）。

【功能与主治】 消积化食，和胃健脾。用于脾胃不和，食滞于中的小儿疳积等症。

【用法与用量】 口服。一次 10ml，一日 3 次，幼儿酌减或遵医嘱。

【规格】 每瓶装 200ml

【贮藏】 密封。

湖北省药品标准公示稿