

## 山麦消食口服液

Shanmai Xiaoshi Koufuye

【处方】 炒麦芽 400g      党参 171.4g      山楂 171.4g  
         黄芪 71.4g      茯苓 71.4g      大枣 71.4g  
         炒白术 71.4g

【制法】 以上七味，加水煎煮二次，第一次 1.5 小时，第二次 1 小时，合并煎液，滤过，滤液静置 12 小时，取上清液，浓缩至约 570ml，放冷，加乙醇使含醇量达 40%，搅匀，静置 24 小时，取上清液，回收乙醇至无醇味。另取蔗糖 200g 制成单糖浆，加入上述药液中，加水至 1000ml，搅匀，滤过，灌装，灭菌，即得。

【性状】 本品为棕黄色或棕褐色的液体；味先甜而后苦。

【鉴别】 取本品 30ml，用水饱和的正丁醇振摇提取 3 次，每次 20ml，合并正丁醇液，用氨试液洗涤 2 次，每次 20ml，弃去氨试液，正丁醇液蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液；另取黄芪甲苷对照品，用甲醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 $\mu$ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-水（13:7:2）的下层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10% 硫酸乙醇溶液，在 105℃ 加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，日光下显相同的棕褐色斑点；紫外光灯（365nm）下显相同的橙黄色荧光斑点。

【检查】 相对密度 应不低于 1.05（中国药典 2025 年版四部通则 0601）。

pH 值 应为 3.0~5.0（中国药典 2025 年版四部通则 0631）。

其他 应符合合剂项下有关的各项规定（中国药典 2025 年版四部通则 0181）。

【功能与主治】 健脾和胃，行气消食，益气和中。用于脾虚气滞所致的脘腹胀满、食少纳差，面黄肌瘦；消化不良见上述症候者。

【用法与用量】 口服。一次 10ml，一日 3 次。

【规格】 每支装 10ml

【贮藏】 密封。