

心康口服液

Xinkang Koufuye

【处方】 红参 75g 南沙参 75g 北沙参 75g
三七 50g 丹参 50g 降香 50g
苦参 50g

【制法】 以上七味，加水煎煮三次，分别为 2、1.5、1 小时。合并煎液，静置 12 小时以上，滤过，滤液浓缩至适量，离心，取上清液加入单糖浆（含糖为 25%），搅匀，滤过，调整总量至 1000ml，灌装，灭菌，即得。

【性状】 本品为淡红棕色液体，久置可有微量沉淀；气香，味甜、微苦。

【鉴别】 （1）取本品 20ml，加水饱和的正丁醇，提取三次，每次 20ml，合并正丁醇液，加三倍量的氨试液洗涤，弃去水层，再用正丁醇饱和的水洗涤三次，每次 15ml，弃去水层，取正丁醇层蒸干，残渣加乙醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取人参皂苷 R_{g1} 、 R_{b1} 、 R_c 对照品适量，分别加乙醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述四种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-水（13 : 7 : 2）10℃以下放置的下层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10% 硫酸乙醇溶液，于 105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

（2）取本品 40ml，加氨试液调 pH 值至 9~10，加三氯甲烷提取三次（40ml、30ml、20ml），分取三氯甲烷层，挥干，残渣加乙醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取苦参碱、槐定碱对照品适量，加乙醇分别制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述三种溶液各 3~5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯-丙酮-甲醇（8 : 3 : 0.5）为展开剂，置氨蒸气饱和的展开缸内展开，展距 8cm，取出，晾干，再以甲苯-乙酸乙酯-甲醇-水（2 : 4 : 2 : 1）10℃以下放置的上层溶液为展开剂，置氨蒸气饱和的展开缸内展开，展距 15cm，取出，晾干，喷以碘化铋钾试液。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 相对密度 应不低于 1.08（中国药典 2025 年版四部通则 0601）。

pH 值 应为 4.0~6.5（中国药典 2025 年版四部通则 0631）。

其他 应符合合剂项下有关的各项规定（中国药典 2025 年版四部通则 0181）。

【功能与主治】 益气养阴，活血化瘀。用于冠心病。

【用法与用量】 口服。一次 20ml，一日 3 次。用前摇匀。

【注意】 请在医师指导下使用。

【规格】 每 1ml 相当于饮片 0.43g

【贮藏】 密封，置阴凉处。