

## 茵黄利胆颗粒

Yinhuang Lidan Keli

【处方】 茵陈 555.6g      茯苓 185.2g      山楂 185.2g  
大黄 157.4g      车前子 185.2g      虎杖 185.2g  
五味子 92.6g

【制法】 以上七味，加水煎煮二次，第一次 2 小时，第二次 1.5 小时，合并煎液，滤过，静置 12 小时，取上清液，减压浓缩至相对密度为 1.30~1.33（70℃）的稠膏，取稠膏，加入适量的蔗糖粉及糊精（稠膏:糊精:蔗糖粉=1:1.3:2.7），混匀，制成颗粒，干燥，制成 1000g，即得。

【性状】 本品为微黄色至棕褐色的颗粒；味甜酸、微苦。

【鉴别】 （1）取本品 10g，加水 50ml 使溶解，离心，取上清液，加乙酸乙酯 5ml，用三氯甲烷振摇提取 2 次，每次 20ml，合并三氯甲烷液，离心，取三氯甲烷液蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取茵陈对照药材 2g，加水 50ml，置水浴中浸渍 4 小时，放冷，滤过，滤液用三氯甲烷振摇提取 2 次，每次 20ml，合并三氯甲烷液，蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 10 $\mu$ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯-丙酮（4:1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光主斑点。

（2）取本品 10g，研细，加甲醇 30ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加水 10ml 使溶解，再加盐酸 1ml，加热回流 30 分钟，立即冷却，用乙醚振摇提取 2 次，每次 10ml，合并乙醚液，挥干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取大黄素对照品，用甲醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 $\mu$ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲酸（15:2:1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同的橙黄色荧光斑点，置氨蒸气中熏后，斑点变为红色。

【检查】 应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典 2025 年版四部通则 0104）。

【功能与主治】 清热利湿，利胆退黄。用于肝胆湿热所致的右胁胀满、恶心厌油、纳差食少、口苦、尿黄、身目发黄；急、慢性肝炎见上述证候者。

【用法与用量】 开水冲服。一次 15~30g，一日 3 次。

【规格】 每 1g 相当于饮片 1.55g

【贮藏】 密封。