

茵陈清肝丸

Yinqin Qinggan Wan

【处方】 柴胡 80g	郁金 80g	茵陈 240g
醋香附 80g	麸炒枳壳 80g	赤芍 80g
姜黄 80g	黄芩 80g	田基黄 80g
蒲公英 120g	夏枯草 120g	五味子 80g
大黄 48g	炒麦芽 120g	炒稻芽 120g
鸡内金 80g	厚朴 80g	甘草 48g

【制法】 以上十八味，取茵陈、田基黄、蒲公英、夏枯草加水煎煮三次，煎煮时间分别为 2、1.5、1 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至相对密度约为 1.20（60℃）的清膏；其余柴胡等十四味粉碎成细粉，过筛，混匀，用清膏、炼蜜与水的混合液泛丸，整粒，干燥，打光，即得。

【性状】 本品为棕褐色的浓缩水蜜丸；味甜、微苦。

【鉴别】 （1）取本品，置显微镜下观察：油管含黄色或棕黄色分泌物，周围薄壁细胞界限不清晰。分泌细胞类圆形或矩圆形，内含淡黄棕色至红棕色分泌物。草酸钙簇晶直径 20~190μm，棱角大多短钝。淡黄色半透明不规则块状物上可见大小不一的类圆形孔洞。种皮表皮石细胞淡黄色，表面观类多角形，大小较均匀，壁厚，孔沟细密，胞腔含暗棕色物。纤维淡黄色，梭形，壁厚，孔沟细。

（2）取本品 10g，研碎，加甲醇 30ml，超声处理 20min，滤过，滤液蒸干，残渣加水 20ml 使溶解，加水饱和正丁醇振摇提取 2 次，每次 20ml，合并正丁醇液，用正丁醇饱和的水洗涤 2 次，每次 20ml，弃去水液，将正丁醇液蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取芍药苷对照品，加甲醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 10μl，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-乙酸乙酯-甲醇-甲酸（40：5：10：0.2）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5% 香草醛硫酸溶液，加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

（3）取本品 15g，研碎，加乙醇 40ml，加热回流 1 小时，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取柚皮苷对照品，加乙醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 1~2μl，分别点于同一聚酰胺薄膜上，以丙酮-水（1：1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 1% 三氯化铝试液，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 应符合丸剂项下有关的各项规定（中国药典 2025 年版四部通则 0116）。

【功能与主治】 疏肝利胆，清热解毒，利胆退黄。用于病毒性肝炎，脂肪肝，胆汁瘀积性肝炎。

【功能与用量】 口服。一次 6g，一日 3 次，小儿酌减。

【注意】 请在医师指导下使用。

【规格】 每 1g 相当于饮片 1.20g

【贮藏】 密封，置阴凉处。

湖北省药品标准公示稿