

制霉洗剂

Zhimei Xiji

【处方】 野菊花 60g 苦参 60g 黄柏 60g
雄黄 30g 明矾 30g 土茯苓 60g
蛇床子 30g 金银花 60g 寻骨风 30g

【制法】 以上九味，除明矾外，雄黄、蛇床子用纱布包好，与其余六味一起加水浸泡 0.5 小时，加水适量煎煮二次，第一次 2 小时，第二次 1.5 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至适量，加入明矾使溶解，静置 24 小时，取上清液加热至沸，加入苯甲酸钠 3g，加热使溶解，滤过，滤液放冷，加水至 1000ml，搅匀，静置，滤过，煮沸，灌装，即得。

【性状】 本品为黄褐色的液体，有部分黄褐色的沉淀；气微香。

【鉴别】 (1) 取本品 10ml，加浓氨试液 0.5ml，用三氯甲烷振摇提取 3 次，每次 10ml，分取三氯甲烷液，蒸干，残渣加三氯甲烷 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取槐定碱对照品适量，加乙醇制成每 1ml 含 0.5mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(中国药典 2025 年版四部通则 0502) 试验，吸取上述两种溶液各 6 μ l，分别点于同一用 2%氢氧化钠溶液制备的硅胶 G 薄层板上，以甲苯-丙酮-甲醇-氨水(8: 3: 0.5: 0.3)为展开剂，展开，展距约 8cm，取出，晾干，喷以碘化铋钾试液。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同的橙色斑点。

(2) 取本品 20ml，置水浴上蒸干，残渣加甲醇 2ml 使溶解，滤过，取滤液作为供试品溶液。另取盐酸小檗碱对照品适量，加甲醇制成每 1ml 含 0.5mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(中国药典 2025 年版四部通则 0502) 试验，吸取供试品溶液 5 μ l，对照品溶液 1 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以环己烷-乙酸乙酯-异丙醇-甲醇-水-三乙胺(3: 3.5: 1: 1.5: 0.5: 1) 为展开剂，置用浓氨试液预饱和 20 分钟的展开缸内，展开，取出，晾干，置紫外光灯(365nm) 下检视。供试品色谱中，在对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 相对密度 应不低于 1.02(中国药典 2025 年版四部通则 0601)。

pH 值 应为 2.5~4.5(中国药典 2025 年版四部通则 0631)。

其他 应符合洗剂项下有关的各项规定(中国药典 2025 年版四部通则 0127)。

【功能与主治】 清热解毒，燥湿杀虫。用于霉菌性阴道炎，外阴瘙痒等症。

【用法与用量】 外用。一次 30ml，加开水适量稀释后，熏洗外阴部 10~15 分钟，一日 2 次，用时摇匀。

【规格】 每瓶装 250ml(每 1ml 相当于饮片 0.42g)

【贮藏】 密封。