

妇科消症洗剂

Fuke Xiaozheng Xiji

【处方】 柴胡 67.5g 肉桂 45g 醋三棱 67.5g
醋莪术 67.5g 桃仁 90g 丹参 112g
醋延胡索 67.5g 赤芍 67.5g 泽兰 67.5g

【制法】以上九味，加水煎煮三次，第一次沸后 1.5 小时，第二次和第三次沸后各 1 小时，合并煎液，离心，滤过，滤液浓缩至 1000ml，分装，灭菌，即得。

【性状】本品为棕褐色液体，有少许沉淀。

【鉴别】（1）取本品 30ml，用 30 ml 乙醚振摇提取，弃去乙醚液，水液用 30 ml 正丁醇振摇提取，分取正丁醇液，加水 20 ml 洗涤，弃去水液，正丁醇液水浴蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取芍药苷对照品，加甲醇制成每 1 ml 含 2mg 溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5ul，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-乙酸乙酯-甲醇-浓氨试液（8：1：4：1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5% 香草醛硫酸溶液，加热至斑点显色清晰，供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

（2）取本品 20ml，用乙酸乙酯振摇提取两次，每次 30 ml，合并乙酸乙酯液，挥干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取丹参对照药材，加水 200ml，煎煮 1.5 小时，滤过，滤液浓缩至 40ml，放冷，用乙酸乙酯振摇提取两次，每次 25ml，合并乙酸乙酯液，挥干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5ul，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-丙酮-甲酸（10：1：1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 3% 三氯化铁乙醇溶液。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】pH 值 应为 4.0-6.0（中国药典 2025 年版四部通则 0631）。

其他 应符合洗剂项下有关的各项规定（中国药典 2025 年版四部通则 0127）。

【功能与主治】活血化瘀，通络止痛。用于子宫肌瘤、附件包块、盆腔炎。

【用法与用量】灌肠、每次 100ml 或遵医嘱。

【注意】孕妇禁用。

【规格】每瓶装 500ml

【贮藏】密封。