

接骨糖浆

Jiegu Tangjiang

【处方】 续断 200g 生地黄 200g 地龙 25g
五加皮 75g 骨碎补 25g 土鳖虫 50g
煅自然铜 25g 丹参 75g 煅龙骨 50g
川牛膝 50g 山药 100g 煅牡蛎 25g
甘草 12g 木瓜 25g 伸筋草 50g

【制法】 以上十五味，加水煎煮二次，第一次 40 分钟，第二次 30 分钟；合并煎液，静置沉淀，滤过，滤液浓缩至适量，加入适量单糖浆、苯甲酸钠，搅匀，调整总量至 1000ml，即得。

【性状】 本品为黑褐色的液体；气微，味甜、涩。

【鉴别】 取本品 30ml，加水饱和的正丁醇振摇提取 2 次，每次 30ml，分取正丁醇层，蒸干，残渣加甲醇 2ml 溶解，作为供试品溶液。另取续断对照药材 1g，加水饱和的正丁醇 30ml 超声提取 20 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 1ml 溶解，作为对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5~10 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以正丁醇-冰醋酸-水(4:1:5)的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10%硫酸乙醇溶液，加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 相对密度 应不低于 1.25（中国药典 2025 年版四部通则 0601）。

pH 值 应为 4.0~6.0（中国药典 2025 年版四部通则 0631）。

其他 应符合糖浆剂项下有关的各项规定（中国药典 2025 年版四部通则 0116）。

【功能与主治】 活血化瘀、接骨续筋。用于骨折。

【用法与用量】 口服。一次 20~30ml，一日 3 次，小儿酌减；或遵医嘱。

【规格】 每瓶装 200ml。

【贮藏】 密封，置阴凉处。