

川香舒心胶囊

Chuanxiang Shuxin Jiaonang

【处方】 三七 153g 川芎 118g 地龙 229g

【制法】 以上三味，粉碎成细粉，制粒，低温干燥，装入胶囊，即得。

【性状】 本品为胶囊剂，内容为棕褐色颗粒；味微苦。

【鉴别】 （1）取本品内容物 10g，研细，加乙醚 60ml，超声处理 20 分钟，滤过，滤液挥干，残渣加乙酸乙酯 1ml 使溶解，作供试品溶液。另取川芎对照药材 2g，加乙醚 60ml，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典 2025 年版四部通则 0502）试验，吸取供试品溶液 15 μ l，对照品溶液 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以环己烷-乙酸乙酯(9:1)为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外灯(365nm)下检视，供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

（2）取本品内容物 2g，加甲醇 20ml，超声处理 1 小时，滤过，滤液蒸干，残渣加水 20ml 溶解，用水饱和正丁醇振摇提取 2 次，每次 25ml，合并水饱和正丁醇液，蒸干，残渣加甲醇 2ml 使溶解，作为供试品溶液。另取人参皂苷 R_{g1} 对照品、三七皂苷 R₁ 对照品加甲醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典 2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述二种溶液各 3 μ l，供试品溶液 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-正丁醇-甲醇-水（2：4：1：2）的下层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10%硫酸乙醇溶液，在 105℃加热数分钟。供试品色谱中，在与对照色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 应符合胶囊剂项下有关规定（中国药典 2025 年版四部通则 0103）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（中国药典 2025 年版四部通则 2201）项下的冷浸法测定，用稀乙醇作溶剂，不得少于 16.0%。

【功能与主治】 行气通络，活血化瘀。适用于血脉瘀阻所致的头昏、胸闷、胸痛、心慌、气短及中风者。

【用法与用量】 口服，一次 3 粒，一日 3 次。

【规格】 每粒装 0.45g

【贮藏】 密封，防潮。