

舒筋糖浆

Shujin Tangjiang

【处方】 当归 60.6g 陈皮 45.5g 赤芍 60.6g
羌活 45.5g 桑寄生 60.6g 五加皮 45.5g
木瓜 60.6g 骨碎补 45.5g 伸筋草 75.6g

【制法】 以上九味，加水煎煮二次，第一次 2 小时，第二次 1.5 小时。合并煎液，滤过，滤液浓缩至每 1ml 约相当于原生药 2g，滤过，滤液浓缩至相对密度 1.10~1.15(60℃)，加入蔗糖 500g 及苯甲酸钠 3g，煮沸使溶解，滤过，加水至 1000ml，搅匀，即得。

【性状】 本品为深棕色的黏稠液体；气香，味甜、微苦。

【鉴别】 (1) 取本品 30ml，加水 60ml 稀释，转移至分液漏斗中，用乙醚振摇提取 3 次，每次 50ml，合并乙醚液，挥干，残渣加乙醇 0.5ml 使溶解，作为供试品溶液。另取当归对照药材 0.5g，加乙醚 20ml，超声处理 10 分钟，滤过，滤液挥干，残渣加乙醇 1ml 使溶解，作为对照药材溶液。再取藁本内酯对照品，加乙醇制成每 1ml 含 0.1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(中国药典 2025 年版四部通则 0502)试验，吸取供试品溶液 5 μ l、对照药材溶液 2 μ l、对照品溶液 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以石油醚(60~90℃)-乙酸乙酯(9:1)为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

(2) 取本品 30ml，加水 60ml 稀释，转移至分液漏斗中，用三氯甲烷振摇提取 2 次，每次 30ml，弃去三氯甲烷液，水液用水饱和的正丁醇振摇提取 2 次，每次 30ml，合并正丁醇液，用正丁醇饱和的水洗涤 2 次，每次 30ml，正丁醇液蒸干，残渣加乙醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取芍药苷对照品，加乙醇制成每 1ml 含 2mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(中国药典 2025 年版四部通则 0502)试验，吸取上述两种溶液各 10 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-乙酸乙酯-甲醇-甲酸(40:5:10:0.2)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 5%香草醛硫酸溶液，在 105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】 相对密度 应不低于 1.16(中国药典 2025 年版四部通则 0601)。

pH 值 应为 3.0~5.0(中国药典 2025 年版四部通则 0631)。

其他 应符合糖浆剂项下有关的各项规定(中国药典 2025 年版四部通则 0116)。

【功能与主治】 祛风除湿，舒筋活络。用于跌打损伤，筋骨疼痛，腰膝酸痛，筋络不舒。

【用法与用量】 口服。一次 10~15ml，一日 3 次。

【规格】 每瓶装 250ml(每 1ml 相当于饮片 0.50g)

【贮藏】 密封。