

活血消肿胶囊

Huoxue Xiaozhong Jiaonang

【处方】 当归70.5g 赤芍70.5g 川芎70.5g 泽兰70.5g
 燂桃仁21.2g 红花28.2g 三七42.3g 制乳香7.1g
 制没药7.1g

【制法】 以上九味，取当归、赤芍、川芎、制乳香、没药、三七六味粉碎成粗粉，其余红花等三味加水煎煮2次，第一次3小时，第二次2小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至适量，加适量乙醇使沉淀，滤过，滤液浓缩，加入上述粗粉中，混匀，干燥，粉碎成细粉，制粒，干燥，装入胶囊，制成1000粒，即得。

【性状】 本品为硬胶囊，内容物为黄棕色至黄褐色粉末或颗粒；气微香，味微苦、涩。

【鉴别】 （1）取本品，置显微镜下观察：树脂道碎片含黄色油滴或块状分泌物（三七）。韧皮薄壁细胞纺锤形，壁略厚，表面有极微细的斜向交错纹理（当归）。

（2）取本品内容物5g，加乙醚40ml，超声处理15分钟，滤过，滤液挥干，残渣加乙酸乙酯0.5ml使溶解，作为供试品溶液。另取川芎对照药材0.5g，加乙醚10ml，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2025年版四部通则0502）试验，吸取上述两种溶液各10μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以环己烷-乙酸乙酯（9:1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光主斑点。

（3）取本品粉末5g，加乙醇30ml，超声处理15分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取芍药苷对照品，加乙醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2025年版四部通则0502）试验，吸取上述两种溶液各10μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以三氯甲烷-乙酸乙酯-甲醇-甲酸（40:5:10:0.2）为展开剂，展开，取出晾干，喷以5%香草醛硫酸溶液，110℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同的蓝紫色斑点。

【检查】 应符合胶囊剂项下有关的各项规定（《中国药典》2025年版四部通则0103）。

【浸出物】 取本品内容物，照水溶性浸出物测定法（《中国药典》2025年版四部通则2201）项下的冷浸法测定，不得少于25%。

【功能与主治】 活血祛瘀，消肿止痛。用于骨折、脱位及软组织损伤的血瘀疼痛者。

【用法与用量】 口服。一次4粒，一日3次。

【注意】 胃溃疡、十二指肠溃疡患者慎用，孕妇慎用。

【规格】 每粒装0.28g

【贮藏】 密封。

修订说明：

【检查】项下浸出物修订为**【浸出物】**，测定由“照浸出物测定法中冷浸法”修订为“照水溶性浸出物测定法项下的冷浸法测定”。