

复方鱼腥草肺炎合剂

Fufang Yuxingcao Feiyan Heji

【处方】 鱼腥草 240g 连翘 160g 败酱草 160g 薏苡仁 120g
麦冬 160g 芦根 160g 黄芩 120g 苦杏仁 80g
桔梗 120g

【制法】 以上九味，加水煎煮 2 次，第一次 2 小时，第二次 1.5 小时，合并煎液，滤过，滤液浓缩至适量，静置 12 小时以上，取上清液加热至沸，加苯甲酸钠 3g，加热搅拌使溶解，滤过，加水调整体积至 1000ml，分装，灭菌，即得。

【性状】 本品为棕黑色的液体；气微，味苦。

【鉴别】 （1）取本品 15ml，加 10%氢氧化钠溶液 2ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液用乙酸乙酯振摇提取 2 次，每次 20ml，合并乙酸乙酯液，蒸干，残渣加乙酸乙酯 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取鱼腥草对照药材 4g，加水 30ml，加热回流 1 小时，滤过，滤液照供试品溶液的制备方法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 10 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-乙酸乙酯-乙醚（6：1：3）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

（2）取本品 10ml，用三氯甲烷振摇提取 3 次，每次 10ml，合并三氯甲烷液，蒸干，残渣加甲醇 2ml 使溶解，加在中性氧化铝柱（100~200 目，6g，内径 1.0cm，干法上柱）上，用甲醇 50ml 洗脱，收集洗脱液，蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取连翘对照药材 2g，加水 30ml，加热回流 1 小时，滤过，滤液浓缩至 10ml，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 10 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以甲苯-丙酮-乙酸乙酯-甲酸-水（7：8：5：1：1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 1%香草醛硫酸溶液，在 105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显示相同颜色的斑点。

（3）取本品 20ml，加乙酸乙酯-甲醇（3:1）100ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加水 20ml 使溶解，用乙酸乙酯振摇提取 2 次，每次 20ml，

合并乙酸乙酯液，再用水洗 2 次，每次 20ml，弃去水液，乙酸乙酯液蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取黄芩对照药材 3g，加水 30ml，加热回流 1 小时，滤过，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 15 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以乙酸乙酯-丙酮-甲酸-水（13：3.5：1：1.5）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 2%三氯化铁乙醇溶液。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显示相同颜色的斑点。

【检查】 相对密度 应不低于 1.05（《中国药典》2025 年版四部通则 0601）。

pH 值 应为 4.0～6.0（《中国药典》2025 年版四部通则 0631）。

其他 应符合合剂项下有关的各项规定（《中国药典》2025 年版四部通则 0181）。

【功能与主治】 清热解毒，化痰止咳。用于病毒性肺炎，支原体，衣原体肺炎引起的肺热咳嗽、吐黄痰等。

【用法与用量】 口服。一次 30～40ml，一日 3 次，用时摇匀。

【注意】 肺炎病情较重者，请在医生指导下配合其他治疗。

【规格】 每瓶装 250ml

【贮藏】 密封，置阴凉处。

修订说明：

【鉴别】（1）项下修订，由“吸取上述两种溶液各 50 μ l”，修订为“吸取上述两种溶液各 10 μ l”。