

三黄消肿酊

Sanhuang Xiaozhong Ding

【处方】黄芩 17.14g	大黄 12.86g	三棱 8.57g	大血藤 12.86g
莪术 8.57g	黄柏 8.57g	红花 12.86g	白芷 8.57g
羌活 6.86g	独活 6.86g	川芎 12.86g	黄芪 12.86g
延胡索 6.86g	牛膝 6.86g		

【制法】以上十四味，粉碎成粗粉，照酊剂项下的浸渍法（《中国药典》2025 年版四部 0120）项下制备，即用 60%乙醇 500ml 作溶剂，与上述粗粉充分搅拌，浸渍 72 小时后，滤过；药渣再用 60%乙醇按上述方法提取两次，每次浸渍 48 小时，第二次用量为 300ml，第三次加入约 200ml，合并 3 次滤液，用 60%乙醇调整总量为 1000ml，搅匀，静置，使澄清，灌装，即得。

【性状】本品为红棕色澄清液体；气香。

【鉴别】(1)取本品 20ml，水浴上蒸干，残渣加水 10ml 使溶解，再加盐酸 1ml，加热回流 30 分钟，立即冷却，用乙醚分 2 次振摇提取，每次 20ml，合并乙醚液，蒸干，残渣加三氯甲烷 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取大黄对照药材 0.5g，加 60%乙醇 20ml，浸泡 1 小时，时时振摇，滤过，取滤液 10ml，自“水浴上蒸干”起，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以石油醚(30~60℃)-甲酸乙酯-甲酸(15:5:1)的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显数个相同颜色的荧光主斑点；置氨气中熏后斑点变为红色。

(2)取本品 10ml，蒸干，残渣加 80%丙酮溶液 5ml，密塞，振摇 15 分钟，静置，取上清液作为供试品溶液。另取红花药材 0.5g，同法制成对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以乙酸乙酯-甲酸-水-甲醇(7:2:3:0.4)为展开剂，展开，取出，晾干。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【检查】乙醇量 应为 50%~58%（《中国药典》2025 年版四部通则 0711）。

总固体 精密量取本品 25ml，置已干燥至恒重的蒸发皿中，水浴上蒸干，在 105℃干燥 3 小时，移置干燥器中，冷却 30 分钟，迅速精密称定重量，遗留残渣不得少于 1.5%。

其他 应符合酊剂项下有关的各项规定（《中国药典》2025 年版四部通则 0120）。

【功能与主治】 消肿止痛。用于局部外伤引起的红肿，肿胀疼痛。

【用法与用量】 外用。将适量大小的敷料在药水中浸透，敷盖于患处，用红外线灯照射，一次 15～20 分钟。

【注意】 外用，不可内服。

【规格】 每瓶装 250ml

【贮藏】 密封，置阴凉处避光保存。

修订说明：

增订【性状】